

Priorix

Vacuna contra sarampión paperas rubeola



INDICACIÓN¹

Priorix está indicada para la inmunización activa contra el sarampión, la parotiditis y la rubéola.

Esquema/dosis¹

Se recomienda una dosis única de 0,5 ml de la vacuna reconstituida. En vista de que los planes de vacunación varían en los diferentes países, el esquema recomendado para cada país deberá estar de acuerdo con las recomendaciones nacionales.

Metodo de administración¹

Priorix debe administrarse mediante inyección subcutánea, aunque también puede administrarse por inyección intramuscular.

Contraindicaciones¹

Priorix está contraindicada en personas con hipersensibilidad sistémica conocida a la neomicina o a cualquier otro componente de la vacuna.

Un historial de dermatitis por contacto con la neomicina no constituye una contraindicación.

Priorix está contraindicada en personas que han mostrado signos de hipersensibilidad después de la administración previa de las vacunas contra el sarampión, la parotiditis o la rubéola.

Priorix está contraindicada para sujetos con inmunodeficiencia humoral o celular (primaria o adquirida) severa, p. ej., infección por VIH sintomático

Priorix está contraindicada para mujeres embarazadas. El embarazo deberá evitarse durante un mes después de la vacunación.

Las marcas son propiedad de o licenciadas al grupo de compañías de GSK.
©2018 Grupo de compañías de GSK o sus licenciantes.